

BILOXCIN Eye

Thuốc nhỏ mắt

Thành phần:

Ofloxacin 15 mg

Tá dược vđ 5 ml

(Tá dược: EDTA, Thimerosal, Manitol, Natri acetat, acid acetic băng, NaOH, Nước cất pha tiêm)

Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt.

Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ x 5 ml.

Dược lực học:

- Ofloxacin là thuốc kháng sinh thuộc nhóm Fluoroquinolon, có phổ kháng khuẩn rộng *Enterobacteriaceae*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Haemophilus influenzae*, *Neisseria spp.*, *Staphylococcus*, *Streptococcus pneumoniae*.

- Ofloxacin có tác dụng diệt khuẩn, cơ chế tác dụng chưa được biết đầy đủ. Giống như các thuốc quinolon kháng khuẩn khác, ofloxacin ức chế DNA - gyrase là enzym cần thiết trong quá trình nhân đôi, phiên mã và tu sửa DNA của vi khuẩn.

Dược động học:

Ofloxacin được hấp thu qua giác mạc vào trong thủy dịch. Hấp thu tăng lên khi mắt bị viêm hay có khiếm khuyết biểu mô. Phân bố của ofloxacin vào trong mô và dịch mắt chưa được mô tả đầy đủ. Các đặc tính về chuyển hóa và thải trừ chưa được giải thích đầy đủ. Nhỏ 1 giọt ofloxacin 0,3% 4 lần/ ngày trong 3 ngày ở người khỏe mạnh, thời gian bán thải của thuốc trong màng nước mắt khoảng 226 phút.

Chỉ định:

Điều trị các bệnh viêm kết mạc, loét giác mạc do các chủng vi khuẩn nhạy cảm với Ofloxacin.

Liều lượng và cách dùng:

· Liều dùng:

- Viêm kết mạc: 2 ngày đầu nhỏ 1 - 2 giọt / 4 giờ. Sau đó nhỏ mỗi lần 1 giọt x 4 lần/ ngày trong 5 ngày nữa.

- Loét giác mạc: 2 ngày đầu 1 - 2 giọt/ 30 phút vào ban ngày và sau khi ngủ 4 - 6 giờ, sau đó nhỏ 1- 2 giọt / 1 giờ vào ban ngày trong khoảng 7 ngày cho đến khi khỏi bệnh nhỏ 1- 2 giọt x 4 lần / ngày.

- Có thể tăng giảm liều tùy theo tình trạng nhiễm khuẩn và theo chỉ định của Bác sĩ.

· Cách dùng:

- Rửa tay sạch trước khi nhỏ thuốc.

- Để đầu lọ thuốc cách lông mi vài centimet để tránh nhiễm bẩn.

- Không nên nhỏ đồng thời nhiều thuốc nhỏ mắt, với mỗi thuốc tốt nhất nên cách nhau khoảng 30 phút.

- Dùng thuốc trong vòng 15 ngày sau khi mở nắp.

Chống chỉ định:

- Mẫn cảm với các thành phần của thuốc.

- Phụ nữ có thai hoặc cho con bú.

Thận trọng:

- Tránh dùng đồng thời với thuốc nhỏ mắt chứa các kháng sinh khác.

- Không nên dùng kính áp tròng khi dùng thuốc.

- Ofloxacin có thể làm phát triển quá mức các chủng vi khuẩn không nhạy cảm, kể cả nấm.

Cần ngưng sử dụng và dùng thuốc khác thay thế.

Tương tác thuốc:

Chưa có nghiên cứu đặc hiệu về tương tác thuốc được thực hiện với Ofloxacin nhỏ mắt. Nếu dùng đồng thời nhiều thuốc nhỏ mắt nên dùng mỗi thuốc cách nhau khoảng 30 phút.

Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú:

- Phụ nữ có thai không được dùng.

- Phụ nữ đang cho con bú nếu không thay thế được Ofloxacin bằng các kháng sinh khác thì nên ngưng cho con bú.

Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy:

Không có ảnh hưởng nào khi lái xe và vận hành máy

Tác dụng không mong muốn của thuốc:

- Cảm giác khó chịu hay nóng rát tại chỗ thoáng qua.

- Cay, đỏ mắt, phù mắt quanh mắt, tăng cảm giác, sợ ánh sáng, nhìn mờ, chảy nước mắt, khô mắt, đau mắt.

- Một số tác dụng phụ toàn thân đã thấy có báo cáo như buồn nôn, hội chứng Stevens-Johnson.

Thông báo cho Bác sĩ biết các tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng.

Quá liều và cách xử trí:

- Không được sử dụng quá liều chỉ dẫn của thầy thuốc.
- Khi quá liều tại chỗ nhỏ mắt có thể dùng nước ấm để rửa mắt.

Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Bảo quản: Nơi khô mát, dưới 300C, tránh ánh sáng.

Đề xa tầm tay của trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến Bác sĩ.

Thuốc này dùng theo đơn của Bác sĩ

Sản xuất tại:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – TTBYT BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR)

498 Nguyễn Thái Học – P. Quang Trung – Tp. Quy Nhơn - Bình Định - Việt Nam

ĐT: 056. 3846040 * Fax: 056. 3846846